

Information/Einverständniserklärung

zur Gabe folgender Medikamente (zutreffendes ankreuzen)



MEDIZINISCH
RADIOLOGISCHES
INSTITUT

Dormicum® Datum/Zeit: Dormicum® verabreicht: mg i.v. Hübe nasal

Indikation/Anwendung: Dormicum® (Injektionslösung/Nasenspray, Wirkstoff Midazolam) ist ein kurzwirksames Benzodiazepin mit dämpfender (sedativer) Wirkung auf das zentrale Nervensystem. Das Medikament wird bei Platzangst angewendet.

Kontraindikationen: Dormicum® darf Patienten, die gegen Benzodiazepine oder einen der Hilfsstoffe gemäss Zusammensetzung überempfindlich reagieren, nicht verabreicht werden. Während der Schwangerschaft und Stillzeit sollte das Medikament nicht eingenommen werden.

Fahrtüchtigkeit/Bedienen von Maschinen: Die angst- und krampflösenden, entspannenden und schlaffördernden Eigenschaften von Dormicum® sowie die möglicherweise kurzzeitig auftretende Amnesie (Erinnerungslücke) wirken sich nachteilig auf die Fahrtüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen aus. Vor der Verabreichung müssen Patienten darauf hingewiesen werden, dass sie bis zum vollständigen Abklingen der Medikamentenwirkung, mindestens jedoch **während 12 Stunden nach der letzten Verabreichung, weder Fahrzeuge lenken noch Maschinen bedienen dürfen.**

Tavegyl® Datum/Zeit* Tavegyl® verabreicht: Ampulle i.v.

Indikation/Anwendung: Tavegyl® (Injektionslösung, Wirkstoff Clemastin) ist ein Antihistaminikum zur Prophylaxe und Therapie allergischer Reaktionen und besitzt eine Wirkungsdauer von bis zu 12 Stunden. Das Medikament wird nur in Ausnahmefällen bei Kontrastmittelunverträglichkeit angewendet.

Kontraindikationen: Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff Clemastin, anderen ähnlichen Antihistaminika oder einem der Hilfsstoffe gemäss Zusammensetzung. Patienten, die unter Porphyrie (Stoffwechselstörung des roten Blutfarbstoffs) leiden sollten nicht mit Tavegyl® behandelt werden. Während der Schwangerschaft und Stillzeit darf das Medikament nicht eingenommen werden.

Fahrtüchtigkeit/Bedienen von Maschinen: Aufgrund der dämpfenden (sedativen) Wirkung hat Tavegyl® einen ausgeprägten Einfluss auf die Fahrtüchtigkeit und die Fähigkeit, Maschinen zu bedienen. Vor der Verabreichung müssen Patienten darüber informiert werden, dass sie in diesem Fall **während 12 Stunden keine Fahrzeuge lenken und keine Maschinen bedienen dürfen.**

Buscopan® Datum/Zeit: Buscopan® verabreicht: Ampulle i.v.

Indikation/Anwendung: Buscopan® (Injektionslösung, Wirkstoff Scopolamin) wirkt krampflösend und bewegungshemmend auf den Magendarmtrakt und wird zur Verbesserung der diagnostischen Bildqualität bei speziellen Bauchuntersuchungen angewendet.

Kontraindikationen: Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der Hilfsstoffe des Medikaments gemäss Zusammensetzung. Bei Patienten mit bekanntem, unbehandeltem grünem Star (Glaukom), Prostatavergrößerung mit Harnverhalt, Passagestörungen des Magendarmtraktes, hoher Pulsfrequenz (Tachykardie) und Muskelschwäche (Myasthenia gravis) ist die Gabe von Buscopan® kontraindiziert. Während der Schwangerschaft und Stillzeit sollte das Medikament nicht eingenommen werden.

Fahrtüchtigkeit/Bedienen von Maschinen: Bei der Verabreichung von Buscopan® können unerwünschte Wirkungen wie Akkommodationsstörungen (Störung der Nah- und Ferneinstellung des Auges) und Schwindelgefühle auftreten. Vor der Verabreichung müssen Patienten darüber informiert werden, dass sie **erst nach Normalisierung der Sehfähigkeit Fahrzeuge lenken oder Maschinen bedienen dürfen.**

Sollten noch Fragen oder Unklarheiten bestehen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ich bestätige hiermit, dass ich über die Wirkung und Risiken des empfohlenen Medikaments aufgeklärt wurde und mit der Gabe des empfohlenen Medikaments einverstanden bin.

Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Datum: Unterschrift Patient/Patientin: Visum MTRA: